



ไข้เลือดออก มีอาการอย่างไรบ้าง?



ปวดศีรษะ



คลื่นไส้
อาเจียน



ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ



เบื่ออาหาร



อาจมีอาการปวดท้อง



วิธีการป้องกันยุงลาย เพื่อนำไกลโซแลนออก



เก็บบ้านให้สะอาด
ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก

ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำ
ให้มิดชิด



เทน้ำในจานรองกระถาง
ต้นไม้ทิ้งบ่อยๆ




กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
น้ำขัง คั่วภาชนะ



ใส่ทรายอะเบทในภาชนะ
เก็บน้ำที่ปิดไม่มิดชิด



ป้องกันยุงกัด
ทายากันยุง นอนในมุ้ง



ระวังไข่เลือดออก!



อันตรายถึงชีวิต



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว



ชุมชนร่วมใจ

1. ปิดฝาภาชนะน้ำ
2. ใส่ทรายอะเบท
3. ปล่อยปลากินลูกน้ำ

